m. soulier, chir. de monpelier

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

WVB

n° 35.

Observation

Dun bubon venerien acompagné dune hernie Cruvale.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le Seize du mois de Mars Mil sept Cent trente un Il vint alhopital Royal un grenadier du Regiment De tallard, agé de 40. ans d'un temperament bilieux atteint D'une chaudepisse depuis six mois, avec un Poulain et un chancre sur le gland, qui etoient Survenu Depuis 8. a 10. jours Seulement, le poulain Estoit Presque aussy gros que les deux poings, fort tendu Et tres douloureux, occupant toute laine et le pli De la cuisse, portant sur les vaisseaux cruraux Ce malade avoit le ventre libre quoy qu'avec tension Et douleur, et il urinoit a son ordinaire son pouls Estoit deprimé accompagné des sueurs froides, avec des foiblesses continuelles. je fis apliquer sur son poulain un cataplasme emolliant Et Supuratif et luy ordonnai une potion cordialle, Malgré tout cela le soir du mesme jour je le trouvai dans le mesme état le poulain fort

ARC 35

Douloureux et le pouls toujours petit, et lui ayant
demandé s'il n'avoit pas fait quelque Excés les
jours precedents il me repondit que non, ~~et~~ Mais qu'il se
sentoit mourir. j'ordonnai qu'on lui fit prendre le
Lilium dans du vin de deux en deux heures, ce
qui fut continué toute la nuit et le lendemain;
Mais les foiblesses, la tension du bas ventre et
Du poulain quy Etoit toujours fort douloureux
Persistant dans le mesme Etat, je Craignois que
Cellui-ci ne se cangrenat. c'est pourquoi je me
Determinai a L'ouvrir. la premiere incision estant
faitte transversalement sur la tumeur, j'aperçus
qu'il y avoit dans le centre une Espece de vessie
gonflée sur laquelle je portai le doigt indice,
Et je fis la seconde incision longitudinale observant
de ne pas toucher a cette vessie, j'emportai ensuitte
avec la mesme precaution une partie des glandes,
ce qui me fit reconnoitre que cette vessie ne pouvoit
Estre produitte que par le deplacement de quelque
viscere du bas ventre. j'agrandis l'incision
Longitudinale du coté du ligament de poupart,
j'achevai d'emporter tous les corps glanduleux,
Et je vis que c'estoit une hernie crurale; je coupai

Le ligament et essayai de faire la reduction sans ouvrir le sac, mais ne pouvant y Reussir a cauze des adherences, je les detruisis et ouvris ce sac dans Lequel je trouvay lepiploon presque cangrené et Durci, ~~et~~ une portion de ce boïau livide. toutes ces parties Estoi^ent^ si adherentes et si confondües les unes avec les autres quil estoit presquïmpossible de les distinguer les unes des autres, le tout paroissant dune mesme Nature et lepiploon ressembloit a du suif friable et durci a cause de la grande pression. je fis une ligature a lepiploon dans sa partie saine et aiant ensuite emporté tout ce quil y avoit de gatté, je Remis le reste avec le boiau dans le bas ventre et pensai la plaie a Lordinaire.

Loperation estant faitte ~~la plus part~~ des foiblesses Et autres accidens ci dessus subsistoient Encore pendant Lespace de deux fois vingt quatre heures. et comme malgré le lilium et les potions cordiales que lon donnoit au malade, il continuoit davoir les extremités froides, je les fis frictionner avec des Linges chauds quon renouvelloit de deux en deux heures, on le couvrit et on le tint le plus chaudement

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

quil fut possible par là son pouls se Ranima
de façon a pouvoir soustenir les saignées qui —
furent faites au nombre de cinq ou six dans deux
Jours et demi, revenu de ces grandes foiblesses
on le mit insensiblement aux Boullions et a la
Soupe, la plaie fut pancée a la maniere ordinaire
mais elle donna beaucoup de peine à se cicatriser
tant par raport au grand delabrement deja fait
Par ces differentes operations, que par raport
aux humiditez que le bas ventre fournissoit. —
Cependant je fis donner des frictions bien menagées.
et Enfin jeus le plaisir de voir guerir radicalemt.
Ce pauvre malade. ce quil y a de surprenant cest
que malgré toutes ces incisions le ligament de
Poupart se reunit et a peine reconnoit on que le .
Malade ait Etté operé -

Cette observation nous fait comprendre de quelle .
Importance il est d'estre circonspect dans Louverture —
Des tumeurs qui viennent a laine ou a quelque autre
partie qui peut estre le siege des hernies, puisquon
pourroit ouvrir Lintestin et causer la mort au
Malade, en croyant douvrir simplement un absés

En Second Lieu elle Sert encore a nous convainere que le vomissement Stercoral ou la passion iliaque n'arrive pas toutes les fois qu'il y a Etranglement, puisque dans notre malade il y avoit un etranglement Considerable sans miserere, lequel depend ~~qu'il Arrive~~ (outre l'étranglement) de la nature de la Matiere qui est plus acre dans certains Sujets, ou de la tension et Sensibilité des parois intestinales qui se contractent a contre sens pour faire le Mouvement antiperistaltique qu'on supose ordinairement pour Cause de cette maladie.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

N.6